	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา	
	วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)	เอกสารหมายเลข : WI-YH-IPD-003 ฉบับที่ : A วันที่ออกเอกสาร : 03/01/2566

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการให้ยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)

หน่วยงาน ผู้ป่วยใน	กลุ่มงาน การพยาบาล
--------------------	--------------------

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการให้ยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)

ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ผู้จัดทำเอกสาร



(นางพารีดาร์ มะณี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ทบทวนเอกสาร



(นางสาวรัตนา รัตนเหม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ผู้อนุมัติใช้



(นายทินกร บินหะยีอารัง)

ผอ.รพ.ยะหา

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

 YAHA CROWN PRINCE HOSPITAL	ประเภท : WI หมายเลขเอกสาร : WI-YH-IPD-003
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)	วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 03/01/2566
ฝ่าย/งาน/ทีม : ผู้ป่วยใน	ครั้งที่แก้ไข : 01 หน้า/จำนวนหน้า : 2/3


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการด้านยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริหารยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดความเคลาดเคลื่อนทางยา

คำจำกัดความ การให้ยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)ในหอผู้ป่วย หมายถึง การรับคำสั่งการรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บยา การเตรียมยา การให้ยา การติดตามประเมินและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงหลังให้ยา

แนวทางการบริหารยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)ในหอผู้ป่วยใน

- 1.การตรวจสอบคำสั่งการใช้ยาของแพทย์
 - 1.1. คำสั่งการใช้ยาความเสี่ยงสูงต้องครบถ้วน ชัดเจน เช่น ชื่อยา ขนาดยา วิธีการให้ยาและความถี่ของการให้ยา
 - 1.2.ไม่ใช่คำย่อที่ไม่เป็นสากล
 - 1.3.หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ โดยคำสั่งการให้ยาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าจำเป็นต้องรับโทรศัพท์ให้ทวนคำสั่งอีกครั้งและติดตามให้แพทย์มาเขียนคำสั่งภายใน 24 ชั่วโมง
2. การคัดลอกคำสั่งการให้ยา
 - 2.1 ทบทวนคำสั่งการใช้ยาให้เข้าใจทั้งชื่อยา ขนาดยาและวิธีการให้ยา หากไม่ชัดเจนควรติดต่อกับแพทย์ผู้สั่งโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนดึง Copy order แพทย์ ไปยังเภสัชกร
- 3 การให้ยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)
 - 3.1 พยาบาล Inchart ตรวจสอบยาความเสี่ยงสูงโดยที่ขวดยา ซองยาจะติดสติ๊กเกอร์สีแดงไว้
 - 3.2 พยาบาล InchartมีการDouble check ยาความเสี่ยงสูงกับพยาบาลผู้ให้ยา เพื่อความมั่นใจเป็นยาที่แพทย์สั่ง
 - 3.3 พยาบาลผู้ให้ยาจัดเตรียมยาสำหรับผู้ป่วย ต้องทราบชนิดของสารละลายที่ต้องใช้ และความเข้มข้น และอัตราเร็วในการให้ยา และเตรียมเครื่อง(infusion pump)ควบคุมการให้ยา High -Alert – Drugs)ทางหลอดเลือดดำและตรวจสอบจำนวนปริมาณสารน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 - 3.4 มีการเฝ้าระวังอาการขณะให้ยาโดยใช้ใบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ (High -Alert – Drugs)




 YAHA CROWN PRINCE HOSPITAL	ประเภท : WI หมายเลขเอกสาร : WI-YH-IPD-003
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ยาเสี่ยงสูง (High -Alert – Drugs)	วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 03/01/2566
ฝ่าย/งาน/ทีม : ผู้ป่วยใน	ครั้งที่แก้ไข : 01 หน้า/จำนวนหน้า : 3/3

3.5 มีการแขวนป้ายยา(High -Alert – Drugs)ที่เตียงผู้ป่วยโดยบอกถึงอาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา High -Alert – Drugs เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติได้เฝ้าระวังกรณีพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้รายงานพยาบาลทันที

3.6 เช็นชื่อในช่องผู้ให้ยา พร้อมทั้งลงเวลา Real time ในช่องเวลา ของใบ Drug profile

3.7 Monitor ระหว่างการให้ยาความเสี่ยงสูงตลอดจนติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา โดยเขียนบันทึกทางการพยาบาล กรณีพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้รายงานแพทย์ทันที และบันทึกรายงานทางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

3.6.ยาที่เหลือจากAmp/vial High -Alert – Drugs .ที่ฉีดกับผู้ป่วยให้เททิ้งโดย Double check กับพยาบาลอีกคนหนึ่งและลงบันทึกในแบบฟอร์มการให้ยาความเสี่ยงสูงพร้อมนำAmp/vial High -Alert – Drugs เปล่าไปห้องยาเพื่อแลกกลับมา(ยา Morphine , pethidine , midazolam เขียนในใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒)

ผู้จัดทำเอกสาร	ผู้รับรอง	ผู้อนุมัติใช้
 (นางพาริดาห์ มณี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	 (นางสาวรัตนา รัตนเหม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	 (นายทินกร บินหะยี้อารง) ผอ.รพร.ยะหา

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต