



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

วิธีปฏิบัติงาน
(Work Instruction)

เอกสารหมายเลข : WI-YH-IPD-004

จัดทำเมื่อ : 09/08/2566

ฉบับที่ : A

แก้ไขครั้งที่ : 00

วันที่ออกเอกสาร : 09/08/2566

หน้าที่ : 1 ของ 3 หน้า

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการใส่สาย NG Tube

หน่วยงาน IPD ตึกพิเศษ

กลุ่มงาน การพยาบาล

วิธีปฏิบัติงาน

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการใส่สาย NG Tube

IPD (ตึกพิเศษ)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ผู้จัดทำเอกสาร

(นางสาวรัศมีแซ ธรรมโสภณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ทบทวนเอกสาร

ผู้อนุมัติใช้


(นางสาวมินตรา ทองธรรมชาติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายทินกร บินหะยีอารง)

ผอก.รพร.ยะหา

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

 YAHA CROWN PRINCE HOSPITAL	ประเภท : WI หมายเลขเอกสาร : WI-YH-IPD-004
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใส่สาย NG Tube	วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 09/08/2566
ฝ่าย/งาน/ทีม : IPD (ตึกพิเศษ)	ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า/จำนวนหน้า : 2/3

แนวทางปฏิบัติการใส่สาย NG Tube

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการใส่ NG Tube อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
2. เพื่อการปฏิบัติการใส่ NG Tube ไปในทิศทางเดียวกัน

คำจำกัดความ

การใส่ NG Tube เป็นการใส่สายที่สามารถโค้งงอได้ เข้าทางรูจมูกผ่านคอลงไปถึงกระเพาะอาหาร เพื่อให้อาหารทางสายยาง เพื่อระบายของเสีย น้ำย่อย ลม ออกจากกระเพาะอาหาร ลดการติดเชื้อ เพื่อล้างกระเพาะอาหารกรณีได้รับสารพิษ หรือได้รับยาเกินขนาด

แนวทางการบริหาร การใส่ NG Tube ในหอผู้ป่วยพิเศษ

1. แพทย์เป็นผู้ให้แผนการรักษา
2. พยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการรักษา และให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

การเตรียมอุปกรณ์




1. สาย NG Tube no. 10 – 16
2. ถุงมือสะอาด
3. ถาดสำหรับวางอุปกรณ์
4. Stethoscope
5. K – Y Jelly
6. Syringe Irrigate
7. Gauze

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ล้างมือก่อนและหลังการใส่ NG Tube
2. นำอุปกรณ์ในการใส่สายให้พร้อม

 YAHA CROWN PRINCE HOSPITAL	ประเภท : WI หมายเลขเอกสาร : WI-YH-IPD-004
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใส่สาย NG Tube	วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 09/08/2566
ฝ่าย/งาน/ทีม : IPD (ตึกพิเศษ)	ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า/จำนวนหน้า : 2/3

3. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงขั้นตอนและเหตุการณ์การใส่ NG Tube โดยสังเขป
4. จัดทำให้ผู้ป่วยนอนในท่าหงาย ศีรษะสูง 30 – 45 องศา
5. ประเมินสภาพผู้ป่วยโดยการตรวจดูรูจมูกข้างที่จะใส่สายว่ามีสิ่งอุดตัน หรือมีความผิดปกติของ Nasal septum หรือไม่ ถ้ามีให้หลีกเลี่ยง
6. บีบสารหล่อลื่นลงบนก๊อช
7. สวมถุงมือสะอาด
8. วัดความยาวของสาย NG Tube ที่จะใส่จากปลายจมูกถึงดั้งหูและจากดั้งหูจนถึงลิ้นปี่ (Xiphoid Process)
9. หล่อลื่นปลายสาย NG tube ประมาณ 4 นิ้ว
10. สอดปลายสาย NG tube เข้าทางรูจมูกข้างใดข้างหนึ่ง แล้วประมาณว่าปลายสายถึงคอหอย ให้ผู้ป่วยช่วยกลืน พร้อมกับผู้ใส่ต้นสาย NG Tube เบาๆจนถึงตำแหน่งที่วัดได้ ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอหรือสำลัก ให้หยุดใส่และดึงสายออกก่อน เพราะปลายสายอาจจะเข้าไปในหลอดลมได้ และให้เริ่มต้นใส่ใหม่
11. ตรวจสอบปลายสายว่าเข้าไปในกระเพาะอาหาร โดยให้ผู้ผู้ป่วยอ้าปากดูว่ามีสายขดม้วน อยู่ในปากหรือไม่
12. ใช้ Syringe Irrigate ดูดสิ่งตกค้างหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร พร้อมทั้งตรวจสอบ โดยใช้หูฟัง (Stethoscope) ฟังที่บริเวณลิ้นปี่ของผู้ป่วย โดยใช้ Syringe Irrigate ดันลมประมาณ 10 – 30 มล. ผ่านสาย NG Tube เร็วๆ จะได้ยินเสียง แสดงว่าปลายสายอยู่ในกระเพาะอาหาร
13. ติดพลาสติกยึดสาย NG tube กับสันจมูก
14. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงเล็กน้อย
15. เก็บอุปกรณ์และบันทึกลงในบันทึกทางการแพทย์พยาบาล

ผู้จัดทำเอกสาร	ผู้รับรอง	ผู้อนุมัติใช้
		
(นางสาวรัศมีแฉะ ธรรมโสภณ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(นางสาวมินตรา ทองธรรมชาติ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	(นายทินกร บินหะยี่อารัง) ผอ.ก.รพ.ยะหา

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต